

KRAIBURG - опит от практиката

Ние сме на пазара в Европа, САЩ и много други страни по света. При тази наша дейност придобиваме опит, който искаме да споделим с вас. Ще се радваме, ако този наш опит бъде полезен за вас. Моля, подскажете ни какви теми ви интересуват.

Благодарим ви, вашият KRAIBURG колектив за развитие и изследване.

ЧЕСТО КРАВИТЕ ЛЕЖЪТ И ПО ПЪТЕКИТЕ

- Ако някоя дойна крава легне на пътеката, това означава, че условията за лежане в бокса са лоши.
- За да избере кравата бокса като място за лежане, там тя трябва да се чувства значително по-добре отколкото на пътеката.
- Животните, които идват от обори, изцяло със скарони подове или са били отглеждани вързани, първо трябва да свикнат с "новата система" с отделни боксове за лежане.
- Влияние на климата: при влажност на въздуха от 70 % и при повече от 24° C животните страдат от топлинен стрес и търсят най-хладните места в обора (напр. отворена врата).

Оптимално

- достатъчно място за безболезнено лягане/ставане и за естествени пози при лежане
 - напр. гъвкав (подвижен) тилов ограничител – пасващ към крави с различна големина.
 - напр. еластичен подлакътник, който позволява естествена поза при лежане с изпънат преден крак и удобна смяна на позата при лежане
- меки и сухи боксове за лежане
- броят на животните спрямо боксовете да е в съотношение 1:1, т.е. да не е пренаселено!

Когато кравите лежат в зоната за ходене, рискът от заболявания на копитата и вимето се повишава. Животните са мръсни, съществува по-голяма опасност от нараняване и общото време за лежане намалява.



Разлика в големината в едно в също стадо



Кравата лежи спокойно в бокса, с изпънат преден крак, и отново преживя

Съвет: При животни, които избягват бокса:

1. Подобрете УСЛОВИЯТА ЗА ЛЕЖАНЕ, като обърнете особено внимание на тилния ограничител и подлакътника.
2. Ако е възможно, свикнете младите животни да лежат в боксовете.



Пренаселеността и липсата на удобства в бокса принуждават кравите да не лежат само в боксовете и да стоят със задните си крака в зоната за ходене. Кравите се цапат повече и са изложени в по-голяма степен на риск от заболявания на копитата.



Февруари, 2010 г.